

ные для Западной Сибири, растущие в лесостепной зоне, и интродуценты. Основу древесного яруса обычно составляют такие виды, как: *Betula pendula*, *Populus nigra*, *P. alba*, *P. tremula*, *Pinus sylvestris*, *Salix alba*, *Acer tataricum*, *Larix sibirica*, *Picea abies*, *P. obovata*, *Ulmus laevis*, *U. pumila* и др. В незначительном количестве встречаются: *Fraxinus lanceolata*, *Quercus robur*, *Thuja occidentalis*, *Elaeagnus argentea*, *Acer ginnala*, *A. platanoides* и др. Обильно разрастается, загущая и угнетая другие виды, *Acer negundo*, который первоначально использовался в защитных насаждениях и в качестве декоративного растения, а впоследствии, не имея соперников в конкуренции за свет и влагу, стал бесконтрольно произрастать повсюду. Во втором ярусе обычны: *Malus baccata*, *Padus avium*, *Sambucus racemosa*, *Crataegus sanguinea*, *Salix caprea*, *Amelanchier canadensis*, *Caragana arborescens*, *Pyrus ussuriensis*, *Lonicera tatarica*, *Cotoneaster melanocarpus*, *Rosa majalis*, *Spiraea media* и др.

Травяной покров также образован как культивируемыми, так и аборигенными видами степной и лесостепной растительности, такими как: *Potentilla argentea*, *Geranium sibiricum*, *Trifolium pratense*, *Filipendula ulmaria*, *Pimpinella saxifraga*, *Phlomis tuberosa*, *Thymus marschallianus*, *Veronica spicata*, *Medicago falcata*, *Stipa capillata*, видами рода *Artemisia* и др. Широко распространены различные синантропные сообщества с преобладанием однолетников, рудеральные сообщества двулетних и многолетних видов, в которых значительное участие принимают: *Chenopodium album*, *Capsella bursa-pastoris*, *Sonchus arvensis*, *Thlaspi arvense*, *Silene nutans*, *Echinochloa crusgalli*, *Convolvulus arvensis*, *Artemisia vulgaris*, *Arctium tomentosum*, *Urtica dioica*, *Cichorium intybus*, а также “беглецы” из культуры (растения, вышедшие из-под контроля за пределы клумб и газонов, где они первоначально были) – *Portulaca oleracea*, *Saponaria officinalis*, *Aquilegia vulgaris*, *Impatiens balsamina*, *Viola tricolor*, *Cosmos bipinnatus*, *Centaurea cyanus*, *Calendula officinalis* и др.

Для поймы и островов по Иртышу характерны ивово-тополевые и кустарниковые сообщества со значительным участием *Salix alba*, *S. viminalis*, *S. caprea*, *S. pentandra* и других видов этого