

(Япония). Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета статистических программ «Biostat», «MedCalc» и Statistica 6.0 [10]. Проверке статистических гипотез предшествовало определение характера распределения. Определяли основные параметры статистики (показатели центральной тенденции и рассеяние). В зависимости от характера распределения и равенства дисперсий использовали или параметрические (t-критерий Стьюдента, ANOVA, корреляционный анализ по Пирсону), или непараметрические (критерий Манна-Уитни или Колмогорова-Смирнова для парного сравнения независимых выборок, ANOVA Краскела-Уоллиса для множественного сравнения, корреляционный анализ по Спирмену) методы проверки статистических гипотез. Мощность статистического исследования и необходимое количество наблюдений в сравниваемых группах пациентов для получения достоверных результатов, профилактики появления ошибок первого и второго рода определяли с помощью соответствующих инструментов из пакета Statistica 6.0 bkb MedCalc. Сравнение относительных величин проводили с помощью точного критерия Фишера двустороннего или критерия χ^2 с поправкой Йетса.

Результаты и обсуждение. В подгруппе беременных с гестозом легкой степени в 53,1% случаев осложнение беременности возникло в сроке более 38 недель, в 3,1% – при переносенной беременности, в сроках 36-38 недель - в 31,3% случаев, в сроках 34-36 недель – в 9,4% случаев (табл. 1).

Таблица 1

Сроки начала гестоза у беременных различных подгрупп основной группы

Сроки начала гестоза	Подгруппа II ₁		Подгруппа II ₂		Подгруппа II ₃	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%
До 28 недель	0	0	1	5,55	5 (p=0,001) [#]	35,7
28-32 недель	0	0	2	11,11	3 (p=0,02) [#]	21,4
32-34 недель	1	3,1	4 (p=0,05) [^]	22,23	2	14,3
34-36 недель	3	9,4	6	33,33	2	14,3
36-38 недель	10	31,3	4	22,23	2	14,3
> 38 недель	17	53,1	1 (p=0,002) [^]	5,55	0 (p=0,002) [#]	0
> 42 недель	1	3,1	0	0	0	0
Всего	32	100	18	100	14	100
Сравнение всех подгрупп ($\chi^2=44,18$, Df=12, p<0,0001) [*]	Сравнение подгруппы III ₁ и III ₂ ($\chi^2=21,35$, Df=6, p<0,002) [*]		Сравнение подгруппы III ₁ и III ₃ ($\chi^2=29,31$, Df=6, p<0,0001) [*]		Сравнение подгруппы III ₂ и III ₃ ($\chi^2=6,81$, Df=5 p=0,24)	

Примечание: * - различия между подгруппами статистически значимы при множественных межгрупповых сравнениях по всем срокам начала гестоза при p<0,05 (тест χ^2). ^ (II₁ и II₂), # (II₁ и II₃) - различия между подгруппами статистически значимы при парных межгрупповых сравнениях по одному сроку при p?0,05 (точный критерий Фишера или критерий χ^2 с поправкой Йетса). Между подгруппой II₂ и II₃ статистически значимых различий нет.

В клинической картине гестоза легкой степени среднее систолическое АД составило 122,1±5,7 мм рт.ст., диастолическое 79,1±3,8 мм рт.ст. Среднее АД соответствовало цифрам 93,7±3,1 мм рт.ст. При этом в 25% случаев АД находилось в пределах нормы. При оценке функции почек в 71,9% случаев выявлена протеинурия от 0,033 до 0,132 г/л (табл. 2). У всех пациенток наблюдался отечный