

синдром той или иной степени выраженности. Прибавка массы тела за период беременности составила $12,6 \pm 3,2$ кг.

Начальные клинические проявления при гестозе средней степени тяжести выявлялись в 5,55% случаев беременности до 28 недель, в 28-32 недели – в 11,11% случаев, в 32-34 недели – в 22,23% случаев, в 34-36 недель – в 33,33% случаев, в 36-38 недель – в 22,23% случаев и в сроке беременности более 38 недель – в 5,55% случаев. При анализе клинической симптоматики гестоза средней степени тяжести в сравнении с показателями гестоза легкой степени тяжести отмечалось увеличение систолического АД на 11,6%, диастолического – на 12,3% ($p > 0,05$), уровень протеинурии находился от 0,132 г/л до 1,0 г/л в 16,6% случаев ($p = 0,042$).

Таблица 2

Клиническая характеристика беременных основной группы в зависимости от тяжести гестоза ($M \pm m$)

Критерии	Основная группа		
	Гестоз легкой степени (n=32)	Гестоз средней степени (n=18)	Гестоз тяжелой степени (n=14)
Систолическое АД, мм рт.ст.	$122,1 \pm 5,7$	$138,2 \pm 4,3^*$	$141,2 \pm 4,2$
Диастолическое АД, мм рт.ст.	$79,1 \pm 3,8$	$90,3 \pm 3,2^*$	$93,7 \pm 3,9$
САД, мм рт.ст.	$93,7 \pm 3,1$	$103,8 \pm 4,2^*$	$124,2 \pm 5,1^*$
Отсутствие артериальной гипертензии, абс./(%)	8 (25)	1 (5,6)	0 (0)
Уровень протеинурии, абс. (%):	23 (71,9)	12 (66,6)	
- 0,033-0,132 г/л	-	3 (16,7)	1 (7) ($p = 0,001$) [*]
- 0,132-1,0 г/л	-	1 (5,6)	8 (57,1) ($p = 0,027$) [*]
- 1,0-3,0 г/л	-	-	5 (35,7) ($p = 0,043$) [*]
Отсутствие протеинурии, абс./(%)	9 (28,1)	2 (11,1) [*]	0 (0)
Выраженность отечного синдрома:			
- отеки I степени	20 (62,5)	10 (55,6) [*]	2 (14,4) ($p = 0,043$) [*]
- отеки II степени	12 (37,5)	6 (33,3)	6 (42,8)
- отеки III степени	-	2 (11,1) [*]	($p = 0,049$) [*]
Отсутствие отеков	-	-	0
Общая прибавка веса за беременность, кг	$12,6 \pm 3,2$	$14,1 \pm 3,9$	$17,6 \pm 4,7$
Классическая триада симптомов, абс. (%)	10 (31,3)	14 (77,8) [*]	14 (100)
Средний возраст, лет	$25,7 \pm 1,2$	$24,9 \pm 1,5$	$27,3 \pm 2,3$

Примечание: * – различия статистически значимы между подгруппами при $p < 0,05$ (количественные признаки: t-критерий Стьюдента, критерии Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова для парного сравнения; качественные признаки: точный критерий Фишера двусторонний при $p < 5$ и критерий χ^2 с поправкой Йетса).

Выраженный отечный синдром был выявлен в 61,2% случаев, при этом отеки III степени отмечались в 22,3% случаев ($p = 0,013$), прибавка массы тела на момент поступления составила $14,1 \pm 3,9$ кг, что статистически значимо не различалась в сравниваемых подгруппах беременных. Проведенная оценка клинических симптомов у беременных подгруппы II₃ в сравнении с группой II₂