

Проявляется резким напряжением и болезненностью мышц. При этом пальпируется очерченное образование в передней брюшной стенке, более отчетливое при поднятии головы в положении лежа. Есть анамнез (напряжение, удар, инъекция и др.). Важно отметить, что за счет раздражения париетальной брюшины возможен дефанс мышц передней брюшной стенки. Характерно отсутствие этих симптомов в других отделах. Нет симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта. Помогает диагностическая пункция передней брюшной стенки.

Лечение при установленном диагнозе преимущественно консервативное.

Заворот жировых подвесок. Преимущественно заворачиваются подвески червеобразного отростка, слепой и сигмовидной кишок. Следствием заворота являются кровоизлияния и некрозы. В основном это операционный или лапароскопический диагноз.

Заподозрить патологию можно клинически при остро развившейся боли, просцируемой на небольшой «пятачок» брюшной стенки при минимальных проявлениях интоксикации.

Острый разрыв аневризмы брюшной аорты проявляются интенсивной болью и вздутием живота, иногда рвотой. Характерны боли в пояснице с иррадиацией в промежность и нижние конечности. Состояние быстро ухудшается из-за острой прогрессирующей анемии и нарушения сердечно-сосудистой деятельности. Может быть болевой продром.

В проекции аорты пальпируется пульсирующее болезненное образование. При ухудшении состояния и возникновении коллапса, обусловленном полным разрывом аневризмы, образование исчезает.

3.11. Рак желудка

Рак желудка является лидером по своей частоте. Семейному врачу необходимо знать, что в противоположность язве он начинается без выраженного болевого синдрома, вследствие чего больные нередко поздно обращаются к врачу. Болезнь «подкрадывается» исподволь, а субъективные жалобы носят неопределенный характер.

Наряду с маловыраженными общими явлениями (потеря общего тонуса, снижение активности и работоспособности) отмечаются и местные, желудочные симптомы: ухудшается аппетит, понижается чувство удовольствия, связанное с едой, даже любимой. Вследствие угасания кислотности возникают тяжесть в желудке и отрыжка тухлым. Такая картина получила название «желудочного дискомфорта».

Нередко больной (мужчины более склонны не обращать внимание на свое здоровье) пренебрегает этими ощущениями, не обращается к врачу, а общие явления остаются незамеченными окружающими или получают с их стороны неправильную трактовку – «разнелился». Между тем очень важно уже при появлении, так называемых, «малых признаков» подвергнуть больного обследованию.