

брюшной полости других раздражающих брюшину жидкостей. Усиление боли при изменении положения тела связано с перемещением раздражающей жидкости.

Перфоративная язва

Кинжальная боль в области эпигастрии

Исчезновение печеночной тупости при перкуссии живота.

Симптом Грекова. Замедление пульса в первые часы после прободения язвы желудка и 12-перстной кишки.

Симптом "серпа". Рентгенологически видимое скопление газа в виде серпа в поддиафрагмальном пространстве.

Острый мезаденит

Симптом Штернберга Болезненность при пальпации по ходу корня брыжейки, т.е. по косой линии Штернберга, идущей из правой подвздошной области в левое подреберье.

Болезни артерий.

Симптом Глинчикова. Аускультативно выявленный систолический шум на любой артерии, имеющей стеноз. Выявляется ниже места сужения.

Симптом Гольдфляма В положении лежа на спине больной поднимает обе нижние конечности, слегка согнутые в коленных суставах, а затем производит сгибательные и разгибательные движения в голеностопных суставах. При наличии ишемических расстройств возникает очень быстрая утомляемость – больной самопроизвольно прекращает работу одной или обеих стоп.

Симптом Краковского Долго не исчезающее "алое пятно" после кратковременного сдавления пальца стопы.

Триада Лериша Высокая перемежающая хромота, отсутствие пульса на всех уровнях нижних конечностей, импотенция характерна для окклюзий дистального отдела брюшной аорты.

Симптом Ратшоу. Больной поднимает вверх руки и начинает делать сгибание и разгибание пальцев. Появление бледности и болей свидетельствует об ишемии верхних конечностей.

Симптом Оппеля. Больной в положении лежа поднимает ноги, разогнутые в коленях до угла 45 градусов и с помощью врача удерживает в таком положении 1 минуту. При наличии ишемии врач наблюдает симметричную или асимметричную бледность подошв.

Симптом Панченко. Коленный симптом Панченко выполняется в положении больного сидя на стуле поочередно на обоих нижних конечностях. Больного просят положить ногу на ногу. После этого врач фиксирует появление на тыле стопы бледной или мраморной окраски, а также возникновение через 3-5 минут ощущений жжения или чувства "ползания мурашек".

Симптом Сасюельса. Исходное положение ног больного такое же, как и при симптоме Оппеля. Больного просят производить быстрые сгибательные и разгибательные движения в голеностопных суставах. Врач наблюдает плантар-