

и ладонью, что чаще встречается при раке молочной железы.

**Симптом Прибрама.** При потягивании за сосок раковая опухоль молочной железы смещается вслед за ним. Исследование проводят 2 руками. Одной – фиксируют опухоль, другой – потягивают за сосок.

### **Заболевания щитовидной железы**

**Симптом Грефе.** Отставание верхнего века от верхнего края радужной при взгляде больного вниз. При этом между верхним веком и радужкой остается белая полоска склеры.

**Симптом Мебиуса.** После фиксации взгляда больного на каком-либо предмете врач начинает медленно приближать этот предмет к носу больного. При этом обнаруживается слабость конвергенции.

**Симптом Штельвага.** Редкое мигание, создающее впечатление неподвижности глаза.

### **Прочие симптомы и пробы**

**Вирхова метастаз.** Плотный безболезненный лимфатический узел, расположенный над девой ключицей вблизи прикрепления грудино-ключично-сосковой мышцы. Свидетельствуют о наличии метастазов (отдаленных, распространяемых по грудному лимфатическому протоку).

**Симптом Гиппократа.** Феномен "шум плеска" при сотрясении стенок любой полости, содержащей жидкость и воздух,

**Симптом Грекова.** Боль, возникающая при надавливании пальцами в нижних межреберных пространствах над зоной расположения поддиафрагмального абсцесса.

**Крукенберга метастазы.** Метастазы в пупок и яичники при раке желудка у женщин.

**Симптом Курвуазье.** Прощупывается увеличенный, растянутый и безболезненный желчный пузырь. Определяют у больных механической желтухой.

**Проба Мельникова.** Для контроля за развитием отека конечности при газовой гангрене накладывают шелковую лигатуру на окружность конечности и наблюдают за быстротой и степенью "врезания" ее в ткани.

**Симптом Промтова.** Болезненность матки при отодвигании ее кверху пальцами, введенными во влагалище или прямую кишку. Свидетельствуют о заболеваниях женских половых органов.

**Шнитцлера метастазы.** Определяют при исследовании через прямую кишку в области пузыряно-прямокишечной клетчатки.