

При легком течении ХОБЛ обострения заболевания возникают 1-2 раза в год, длительностью до 2-3 недель, отсутствуют выраженные осложнения (ХЛС и его декомпенсация и др.), ОФВ<sub>1</sub> до 70% от должного, дыхательная недостаточность I степени, лечение достаточно эффективно, сохраняется способность к самообслуживанию, передвижению, обучению, трудовой деятельности, реабилитационный потенциал высокий.

ХОБЛ средней тяжести характеризуется развитием обострений 3-4 раза в год, ОФВ<sub>1</sub>=69-50% от должного, нарастает дыхательная недостаточность, появляются и постепенно прогрессируют признаки хронического легочного сердца и сердечной недостаточности, отсутствует стойкий эффект от лечения, реабилитационный потенциал умеренный, что обуславливает выраженные ограничения жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, передвижению, обучению, трудовой деятельности).

*Таблица 1*

*Клинико-функциональная характеристика ХОБЛ  
по степени тяжести [142]*

| Признак                                         | Степень тяжести           |                                |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                 | легкая                    | средней тяжести                | тяжелая         |
| Частота обострений заболевания в течение года   | 1-2                       | 3-4                            | 5 и >           |
| Значение ОФВ <sub>1</sub> от должного, %        | до 70                     | 69-50                          | <50             |
| Степень ДН                                      | I                         | II                             | III             |
| ХЛС                                             | отсутствует               | компенсация или субкомпенсация | декомпенсация   |
| Эффект от лечения                               | сохраняется               | отсутствует                    | отсутствует     |
| Ограничение способности к трудовой деятельности | I степени или отсутствует | 2 или 3 степени                | 3 степени       |
| Другие ограничения жизнедеятельности            | отсутствуют               | 1 или 2 степени                | 2 или 3 степени |
| Реабилитационный потенциал                      | высокий                   | умеренный                      | низкий          |