

**ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ**

Формирование инвалидности при ХОБЛ происходит под воздействием факторов среды обитания. Факторы среды обитания и производственной среды влияют на выраженность ограничений жизнедеятельности и, соответственно, на тяжесть инвалидности.

Проведен анализ факторов среды обитания и производственной среды больных профессиональным бронхитом и ХОБЛ на территории Омской области в течение 1993-2003 гг.

Результаты оценки влияния анализируемых факторов на формирование ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности, а также на тяжесть инвалидности представлены в таблицах 2–4.

Таблица 2

Результаты оценки влияния экзогенных и эндогенных факторов на формирование инвалидности вследствие профессионального бронхита и ХОБЛ (μ^2 , p)

Факторы	Наблюдаемые группы инвалидов					
	Все инвалиды вследствие ХОБЛ		Инвалиды вследствие ПБ		Инвалиды вследствие ХОБЛ	
	N=67		n=40		n=37	
	μ^2	p	μ^2	p	μ^2	p
Место проживания	11,9	<0.001	1,1	>0.1	11,7	>0.1
Благоустроенность жилья	6,2	<0.05	0,1	>0.1	0,2	>0.1
Отсутствие отдельного жилья	8,0	<0.05	1,7	>0.1	2,8	>0.1
Проживание с родственниками	12,0	<0.001	9,0	>0.05	0,0	>0.1
Наличие вредных привычек	5,4	>0.1	22,9	>0.05	0,0	>0.1
Характер вредных привычек	10,4	<0.05	22,9	<0.05	3,1	>0.1
Длительность курения	3,6	>0.1	0,6	>0.1	42,7	<0.01
Диспансерный учет в детстве	4,9	<0.05	6,5	<0.05	0,0	>0.1