

Близкие родственники болели хроническими заболеваниями органов дыхания	4,7	<0.05	0,9	>0.1	5,9	>0.1
Отсутствие работы	28,5	<0.001	23,3	<0.001	0,7	>0.1
Причины отсутствия работы	7,7	<0.001	34,2	<0.001	1,1	>0.1
Занятость в сфере производства	9,1	<0.01	2,7	>0.1	1,6	>0.1
Стаж работы во вредных условиях труда	5,5	<0.05	0,1	>0.1	5,6	>0.1
Диагноз поставлен специалистом не по профилю заболевания	3,6	<0.05	2,6	>0.1	2,5	>0.1
Возраст, в котором установлен диагноз заболевания	6,9	<0.05	0,7	>0.1	5,4	>0.1
Частота флюорографического обследования	6,4	<0.05	3,3	>0.1	0,7	>0.1
Диспансерное наблюдение непрофильным специалистом	9,2	<0.01	8,7	<0.05	1,2	>0.1
Характер лечения в период обострения заболевания	11,3	<0.01	11,2	<0.05	5,7	>0.1
Уровень образования	4,1	>0.1	7,8	>0.1	43,9	<0.001

Таблица 3

Результаты оценки влияния экзогенных и эндогенных факторов на формирование 2 группы инвалидности вследствие профессионального бронхита и ХОБЛ (μ^2 , p)

Факторы	Наблюдаемые группы инвалидов					
	Все инвалиды вследствие ХОБЛ		Инвалиды вследствие ПБ		Инвалиды вследствие ХОБЛ	
	n=28		n=14		n=4	
	μ^2	p	μ^2	p	μ^2	p
Место проживания	0,5	>0.1	5,8	<0.05	1,2	>0.1
Близкие родственники болели хроническими заболеваниями органов дыхания	4,4	<0.05	2,1	>0.1	6,0	>0.1
Отсутствие работы	6,8	<0.01	14,1	<0.01	0,7	>0.1
Характер вредных привычек	10,9	<0.05	7,1	>0.1	3,1	>0.1
Длительность курения	1,7	>0.1	2,4	>0.1	42,7	<0.01
Интенсивность курения	18,6	<0.01	11,5	<0.05	15,6	>0.1
Стаж работы на предприятии	7,1	<0.05	2,5	>0.1	26,1	<0.05
Диспансерное наблюдение непрофильным специалистом	0,5	>0.1	5,5	<0.05	2,8	>0.1