

Таблица 4

Результаты оценки влияния экзогенных и эндогенных факторов на формирование 3 группы инвалидности вследствие профессионального бронхита и ХОБЛ (μ^2 , р)

Факторы	Наблюдаемые группы инвалидов					
	Все инвалиды вследствие ХОБЛ		Инвалиды вследствие ПБ		Инвалиды вследствие ХОБЛ	
	n=59		n=26		n=33	
	μ^2	р	μ^2	р	μ^2	р
Место проживания	13,6	<0.001	0,9	>0.1	0,11	>0.1
Возраст	7,7	<0.05	1,8	>0.1	6,6	>0.1
Благоустроенность жилья	7,4	<0.01	0,4	>0.1	0,2	>0.1
Отсутствие отдельного жилья	9,2	<0.05	4,0	>0.1	2,8	>0.1
Проживание с родственниками	5,3	<0.05	3,8	>0.1	0,0	>0.1
Наличие вредных производственных выбросов вблизи жилья	0,2	>0.1	9,8	<0.01	3,2	>0.1
Интенсивность курения	17,0	<0.05	13,5	<0.05	15,6	>0.1
Диспансерный учет в детстве	4,9	<0.05	5,6	<0.05	0,3	>0.1
Родители болели хроническими заболеваниями органов дыхания	3,9	<0.05	0,0	>0.1	0,0	>0.1
Близкие родственники болели хроническими заболеваниями органов дыхания	12,6	<0.001	0,0	>0.1	5,9	>0.1
Отсутствие работы	8,0	<0.01	3,2	>0.1	0,7	>0.1
Причины отсутствия работы	18,6	<0.001	28,2	<0.001	1,1	>0.1
Диагноз поставлен специалистом не по профилю заболевания	4,2	<0.05	0,0	>0.1	2,5	>0.1
Характер производственных вредностей	7,2	<0.05	2,1	>0.1	0,2	>0.1
Занятость в сфере производства	11,8	<0.01	1,3	>0.1	1,6	>0.1