

Подавляющее большинство больных ПБ работали по рабочим специальностям – 94,1% (64 чел.). Общий стаж работы по данной профессии составил в подавляющем большинстве случаев (n=66 чел., 97,1%) более 10 лет. Стаж работы на одном предприятии в большей части наблюдений (n=62 чел., 91,2%) также составил более 10 лет.

Стаж работы по приобретенной профессии у больных ХОБЛ в подавляющем большинстве случаев (75,7%) составил более 10 лет, при этом большая часть больных (62,2%) проработала на одном предприятии также больше 10 лет.

Занятость инвалидов до установления инвалидности в определенных профессиях, стаж работы по приобретенной профессии статистически достоверного влияния на формирование ограниченной жизнедеятельности и социальной недостаточности не оказывают. Для формирования 2 группы инвалидности при ХОБЛ различной этиологии ($\mu^2=7,1$; $P<0.05$) и при ХОБЛ непрофессионального генеза стаж работы на предприятии можно рассматривать как инвалидизирующий фактор ($\mu^2=26,1$; $p<0.05$).

У всех обследованных больных ПБ работа была связана с вредными производственными факторами (табл.10).

Таблица 10

Характеристика условий труда больных профессиональным бронхитом и ХОБЛ до установления инвалидности
(абс. ч., %, p)

	ПБ (n=68)		ХОБЛ (n=37)		p
	абс.	%	абс.	%	
Ранее работали во вредных условиях труда	68	100	33	89,2	<0.05
из них в условиях:					
- повышенной запыленности	13	19,1	5	15,2	>0.1
- воздействия паров и газов токсикантов в концентрациях, превышающих предельно допустимые	1	1,5	1	2,7	>0.1
- значительных перепадов температур	2	2,9	6	18,2	<0.05
- повышенной влажности	-	-	2	6,1	>0.1
- контакта с ядохимикатами	-	-	3	8,1	>0.1
- сочетания производственных вредностей	52	76,5	16	48,5	<0.01