

специальное – 26,5% (18 чел.), высшее – 1,5% (1 чел.). Среди больных ХОБЛ 62,2% (23 чел.) получили начальное ($n=14$ чел.; 37,8%) и среднее образование ($n=9$ чел.; 24,3%), а 8,1% (3 чел.) вообще не имеют образования. Только 27,0% инвалидов вследствие ХОБЛ (10 чел.) получили среднее специальное образование и 2,7% (1 чел.) – высшее. Уровень образования достоверного влияния на формирование инвалидности при ХОБЛ в целом не оказывает ($p>0.1$), однако при ХОБЛ непрофессионального генеза данный фактор с высшей степенью достоверности влияет на возникновение инвалидности ($\mu^2=43,9$; $p<0.001$).

На момент освидетельствования работали 35,3% больных ПБ (24 чел.). Из числа неработающих являлись инвалидами 88,6% (39 чел.) респондентов. Подавляющее большинство больных ХОБЛ ($n=35$ чел.; 94,6%) не работали в связи с пребыванием на инвалидности. При этом по результатам освидетельствования в учреждении медико-социальной экспертизы большая часть респондентов была признана ограниченно трудоспособными – инвалидами 3 группы.

Среди основных причин отсутствия работы следует отметить: пребывание на инвалидности, отсутствие подходящей по состоянию здоровья работы, пенсионный возраст.

Такой фактор, как отсутствие работы у инвалидов вследствие ХОБЛ различной этиологии, оказывает влияние на формирование инвалидности у данной категории больных с высшей степенью достоверности ($\mu^2=28,5$; $p<0.001$), при этом указанный фактор достоверно влияет на тяжесть инвалидности ($\mu^2=6,8$ при 2 группе и $\mu^2=8,0$ при 3 группе инвалидности; $p<0.01$). Причины того, что инвалиды в настоящее время не работают, с высшей степенью достоверности оказывают влияние на формирование инвалидности при ХОБЛ в целом ($\mu^2=7,7$; $p<0.001$) и 3 группы инвалидности вследствие данной патологии ($\mu^2=18,6$; $p<0.001$).

При профессиональном бронхите отсутствие работы у инвалидов с высшей степенью достоверности оказывает влияние на формирование инвалидности ($\mu^2=23,3$; $p<0.001$), при 2 группе инвалидности – с высокой степенью достоверности ($\mu^2=14,1$; $p<0.01$). Кроме того, при 3 группе инвалидности вследствие ПБ с высшей степенью достоверности оказывают влияние вышеуказанные причи-