

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БРОНХИТЕ И ХОБЛ

Среди эндогенных факторов анализировались: наличие хронических бронхо-легочных заболеваний у родителей и других близких родственников, пол, возраст, диспансерный учет в детстве по поводу хронического заболевания органов дыхания, а также возраст, в котором установлен диагноз хронического бронхита (табл. 14).

Таблица 14

Распространенность эндогенных факторов, влияющих на формирование инвалидности при профессиональном бронхите и ХОБЛ (абс. ч., %, p)

Фактор	ПБ n=68		ХОБЛ n=37		p
	абс.	%	абс.	%	
Состояли в детстве на диспансерном учете по поводу хронического заболевания органов дыхания	6	8,8	30	81,1	<0.001
Родители болели хроническими заболеваниями органов дыхания	9	13,2	19	51,4	<0.001
Близкие родственники болели хроническими заболеваниями органов дыхания	5	7,4	22	59,5	<0.001

Средний возраст установления инвалидности вследствие ПБ составил $51,7 \pm 0,8$ года, вследствие ХОБЛ – $44,3 \pm 1,5$ года. Указанный фактор достоверного влияния на формирование инвалидности при данной патологии не оказывает ($p > 0.1$).

Длительность пребывания на инвалидности при профессиональном бронхите составляла в среднем $5,9 \pm 0,5$ года, при ХОБЛ – $4,0 \pm 0,6$ года. Подавляющему большинству больных ПБ диагноз установлен в возрасте старше 40 лет (75%), при ХОБЛ - в возрасте до 40 лет (67,6%).