

пульмонолога – 7,4% (5 чел.). Наблюдались у нескольких специалистов 38,2% (26 чел.) больных ПБ. На момент освидетельствования состояли на диспансерном учете все больные ХОБЛ, при этом наблюдались только у участкового терапевта 46,0% больных (17 чел.), у пульмонолога – 35,1% (13 чел.), у нескольких специалистов – 18,9% инвалидов (7 чел.).

Диспансерное наблюдение больных ХОБЛ в целом у специалистов различного профиля может рассматриваться как фактор, способствующий инвалидизации при данной патологии ($\mu^2=9,2$; $p<0.01$), а также при профессиональном бронхите в целом ($\mu^2=8,7$; $p<0.05$) и при 2 группе инвалидности вследствие ПБ ($\mu^2=5,5$; $p<0.05$).

При ПБ диагноз был установлен пульмонологом в 47,1% случаев (32 чел.), фтизиатром – в 2,9% (2 чел.) наблюдений, участковым терапевтом – 23,5% (16 чел.). Подавляющему большинству больных ПБ (97,1% – 66 чел.) диагноз заболевания был установлен после обследования в специализированном пульмонологическом отделении стационара. Диагноз хронической обструктивной болезни легких был поставлен пульмонологом в 89,2% случаев (33 чел.). По одному человеку (2,7%) в момент установления диагноза наблюдались у аллерголога и фтизиатра, 2 человека (5,4%) – у участкового терапевта. Большей части инвалидов вследствие ХОБЛ (97,3% – 36 чел.) диагноз был установлен в условиях специализированного пульмонологического отделения стационара.

Проведенный анализ показал достоверное влияние установления диагноза заболевания непрофильным специалистом на формирование инвалидности при ХОБЛ в целом ($\mu^2=3,6$; $p<0.05$) и 3 группы инвалидности ($\mu^2=4,2$; $p<0.05$).

Во время обострения заболевания проходят лечение в условиях стационара 79,4% (54 чел.) больных ПБ, из них в пульмонологическом отделении стационара – 38,2% (26 чел.), в терапевтическом отделении – 41,2% (28 чел.). Амбулаторное лечение в период обострения получали 20,6% (14 чел.). Из общего числа больных 2,9% (2 чел.) в период обострения лечились как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. Во время обострения заболевания получали лечение в условиях стационара 91,9% инвалидов вследствие ХОБЛ (34 чел.), из них в пульмонологическом отделении -