

- стаж работы на предприятии ($\mu^2=7,1$; $p<0.05$);
- наличие хронического бронхолегочного заболевания у близких родственников ($\mu^2=4,4$; $p<0.05$).

2 группа инвалидности вследствие профессионального бронхита определяется:

- отсутствием работы ($\mu^2=14,1$; $p<0.01$);
- местом проживания ($\mu^2=5,8$; $p<0.05$);
- интенсивностью курения ($\mu^2=11,5$; $p<0.05$);
- диспансерным наблюдением непрофильным специалистом ($\mu^2=5,5$; $p<0.05$).

При **ХОБЛ на формирование 2 группы инвалидности** влияют:

- длительность курения ($\mu^2=42,7$; $p<0.01$);
- стаж работы на предприятии ($\mu^2=26,1$; $p<0.05$).

3 группа инвалидности при ХОБЛ различного генеза обусловлена:

- отсутствием работы ($\mu^2=8,0$; $p<0.01$);
- причинами отсутствия работы ($\mu^2=18,6$; $p<0.001$);
- местом проживания ($\mu^2=13,6$; $p<0.001$);
- благоустроенностью жилья ($\mu^2=7,4$; $p<0.01$);
- наличием отдельного жилья ($\mu^2=9,2$; $p<0.05$);
- проживанием с родственниками ($\mu^2=5,3$; $p<0.05$);
- интенсивностью курения ($\mu^2=17,0$; $p<0.05$);
- характером производственных вредностей ($\mu^2=7,2$; $p<0.05$);
- занятостью в сфере производства до установления инвалидности ($\mu^2=11,8$; $p<0.01$);
- постановкой диагноза заболевания непрофильным специалистом ($\mu^2=4,2$; $p<0.05$);
- наличием хронических бронхолегочных заболеваний у родителей ($\mu^2=3,9$; $p<0.05$), а также у близких родственников ($\mu^2=12,6$; $p<0.001$);
- диспансерным учетом в детстве по поводу хронического бронхолегочного заболевания ($\mu^2=4,9$; $p<0.05$).

При **профессиональном бронхите на формирование 3 группы инвалидности** оказывают влияние:

- причины отсутствия работы ($\mu^2=28,2$; $p<0.001$);