

*Длительность заболевания при профессиональном  
бронхите и ХОБЛ*

Длительность течения заболевания	ПБ (n=86)		ХОБЛ (n=84)		p
	абс.	%	абс.	%	
До 5 лет	44	51,1	15	17,9	<0.001
6 – 10 лет	23	26,7	14	16,7	>0.1
11 -15 лет	12	14,0	12	14,3	>0.1
16 -20 лет	6	7,0	19	22,6	<0.01
Более 20 лет	1	1,2	24	28,5	<0.001

Подавляющее большинство пациентов в обеих группах – в возрасте от 50 до 59 лет: 64,0% от общего числа больных профессиональным бронхитом и 64,3% от общего числа больных ХОБЛ. Средний возраст больных ПБ составил  $52 \pm 1,8$  года, больных ХОБЛ –  $50 \pm 3,9$  года.

Длительность заболевания составила от года до 20 и более лет, в среднем при профессиональном бронхите –  $11 \pm 2,4$  года, при ХОБЛ –  $15 \pm 2,9$  года (табл.17).

Все наблюдаемые пациенты имели сопутствующую патологию. При этом заболевания органов дыхания отмечались в 20,9% случаев при ПБ и в 56% наблюдений при ХОБЛ. У больных профессиональным бронхитом, кроме того, отмечалась патология органа слуха, опорно-двигательного аппарата и нервной системы профессиональной этиологии (табл.18).

Среди обследованных пациентов 46 чел. (27,1%) направлены в учреждение медико-социальной экспертизы на первичное освидетельствование (табл.19), на переосвидетельствование направлены 124 чел. (72,9%).

Из числа впервые освидетельствованных больные ПБ составили 39,1% (18 чел.), пациенты, страдающие ХОБЛ – 60,9% (28 чел.). Среди повторно освидетельствованных больные ПБ составили 54,8% (68 чел.), пациенты с ХОБЛ – 45,2% (56 чел.).

При первичном освидетельствовании больных профессиональным бронхитом 3 группа инвалидности определена 7 пациентам (38,9% от числа впервые освидетельствованных с данной патоло-