

*Сопутствующая патология у больных
профессиональным бронхитом и ХОБЛ (абс. ч., %, p)*

Нозологическая форма	ПБ		ХОБЛ		p
	n=86		n=84		
	абс.	%	абс.	%	
Профессиональная патология:					
- нейро-сенсорная тугоухость	21	24,2	-	-	<0.001
- вибрационная болезнь	11	12,8	-	-	<0.001
- деформирующий остеоартроз	2	2,3	-	-	>0.1
- полинейропатия	6	7,0	-	-	<0.05
- полирадикулопатия	2	2,3	-	-	>0.1
- профессиональная интоксикация	4	4,7	-	-	<0.05
- астено-невротический синдром	3	3,5	-	-	>0.1
- плечелопаточный периартроз	2	2,3	-	-	>0.1
Патология органов дыхания:					
- бронхиальная астма	14	16,3	4	4,8	<0.05
- плеврит	1	1,2	4	4,8	>0.1
- трахеобронхиальная дискинезия	1	1,2	1	1,2	>0.1
- бронхоэктазы	1	1,2	16	19	<0.001
- гипоплазия легких	-	-	2	2,4	>0.1
- последствия оперативных вмешательств на легких	1	1,2	14	16,7	<0.001
- поликистоз легких	-	-	3	3,6	>0.1
- синдром исчезающего легкого	-	-	1	1,2	>0.1
- туберкулез легких	-	-	2	2,4	>0.1

гией), установлена степень утраты профессиональной трудоспособности без определения группы инвалидности 10 пациентам (55,6%). Степень утраты профессиональной трудоспособности и группа инвалидности не установлены в 5,5% случаев (1 чел.). Первая и вторая группы инвалидности при первичном освидетельствовании больным ПБ не устанавливались.

При первичном освидетельствовании пациентов, страдающих ХОБЛ, определена 2 группа инвалидности в 1 случае (3,6% от числа впервые освидетельствованных), 3 группа инвалидности – в 8 случа-