




Рис.17. Структура профессионального бронхита (%)

предприятиях пищевой промышленности, 1 чел. (1,2%) – на ФГУП «Полет», 1 чел. (1,2%) – в МУЗ «Больница скорой медицинской помощи №2», 1 чел. (1,2%) – на заводе им. Попова, 1 чел. (1,2%) – на МУП «Водоканал», 2 чел. (2,3%) – на предприятиях легкой промышленности, 8 чел. (9,3%) – на сельскохозяйственных предприятиях различных районов Омской области, 1 чел. (1,2%) – на шахтах Кузбасса, а также на других предприятиях.

Больные ПБ имели стаж работы во вредных условиях труда от 5 до 25 и более лет, в среднем $21 \pm 2,4$ года, при этом 54,7% обследованных работали во вредных условиях более 20 лет. Следует отметить, что у подавляющего большинства пациентов ($n=48$ чел., 55,8%) патологические изменения в легких выявлены на I-II стадии развития хронического воспалительного процесса в легких, в 36,1% случаев – на II стадии заболевания. Пациентов со II-III и III стадиями заболевания направлено на освидетельствование 7 чел. (8,1%).

Стадия ПБ статистически достоверно утяжеляется с увеличением длительности заболевания (табл.21). При этом достоверно уменьшается численность больных с I-II стадией ($p<0.001$) и со II стадией заболевания ($p<0.05$). Число больных с III стадией заболевания, напротив – увеличивается ($p<0.01$).