

*Зависимость стадии профессионального бронхита
от длительности его течения*

Длительность течения заболевания*	Стадия заболевания								Всего (n=86)	
	I-II стадия (n=48)		II стадия (n=31)		II-III стадия (n=4)		III стадия (n=3)			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
До года	16	33,3	2	6,4	-		-		18	20,9
1-5 лет	18	37,5	14	45,2	3	75,0	-		35	40,7
6-10 лет	6	12,5	8	25,8	1	25,0	3	100	18	20,9
11-15 лет	6	12,5	3	9,7	-		-		9	10,5
Более 15 лет	2	4,2	4	12,9	-		-		6	7,0

Примечание: * от момента установления профессионального характера заболевания.

Установлено, что при длительности стажа работы во вредных условиях более 15 лет достоверно ($p<0.01$) увеличивается число больных ПБ со II стадией заболевания, численность пациентов с III стадией, напротив, снижается ($p<0.01$), поскольку такие больные направляются на медико-социальную экспертизу на более раннем этапе развития заболевания.

Пациенты на ранней стадии развития заболевания (0-I, I стадии ПБ) на освидетельствование не направлялись.

Анализ представленной медицинской документации показал, что связь заболевания с профессией устанавливалась в среднем через $5,7 \pm 1,7$ года от момента появления первых признаков патологического процесса.

В группе больных ПБ наиболее часто встречались жалобы на: кашель, одышку, слабость и потливость (табл.22).

Кашель наблюдался у всех больных ПБ, при этом в 53,5% случаев сопровождался отделением мокроты. Микроскопическое исследование мокроты показало, что в 2 случаях (2,3%) она носила слизисто-гнойный характер, в остальных наблюдениях - слизистый характер.