

Эмфизематозное расширение грудной клетки отмечалось у 79 больных (91,9%), деформация грудной клетки после перенесенного оперативного лечения имела место в 1 случае (1,2%). Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания наблюдалось у 11 больных (12,8%). Учащенное дыхание имело место в 27 наблюдениях (31,4%). Повышенное артериальное давление на момент осмотра зафиксировано у 38 пациентов (44,2%).

Коробочный оттенок перкуторного звука отмечался у 79 больных (91,9%).

При аускультации жесткое дыхание выявлено у 85 обследованных (98,8%), у 1 больного (1,2%) – ослабленное дыхание. Единичные сухие хрипы выслушивались в 13 случаях (15,1%), рассеянные сухие хрипы – в 39 наблюдениях (45,3%), сухие свистящие хрипы – у 12 больных (14,0%), что свидетельствует о присоединении бронхоспазма. У 1 больного (1,2%) отмечались также влажные хрипы.

Приглушенность сердечных тонов имела место в 84 случаях (97,7%), акцент II тона на легочной артерии наблюдался у 4 больных (4,7%). В 1 случае (1,2%) отмечалась мерцательная аритмия, подтвержденная данными ЭКГ.

При исследовании органов брюшной полости гепатомегалия выявлена у 5 больных (5,8%). Отеки на ногах имели место в 10 случаях (11,6%).

В общем анализе крови ускоренная СОЭ выявлена у 29 больных (33,7%), причем в 2 случаях (2,3%) в сопровождении лейкоцитоза со сдвигом влево.

Результаты инструментальных исследований, проведенных больным ПБ, представлены в табл.24.

При ЭКГ выявлено отклонение электрической оси сердца вправо у 15 больных (17,4%), признаки гипертрофии и перегрузки правого желудочка – в 7 случаях (8,1%), признаки гипертрофии и перегрузки правого предсердия – в 10 наблюдениях (11,6%). Неполная блокада правой ножки пучка Гиса имела место у 5 больных (5,8%). Метаболические изменения в миокарде выявлены в 19 случаях (22,1%).

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки признаки эмфиземы легких имели место у 51 больного (59,3%), пневмосклероза – в 80 случаях (93,0%).