

При бронхоскопическом исследовании 44 больных диффузный катаральный эндобронхит 1 степени интенсивности воспаления отмечался у 18 чел. (20,9%), 2 степени – в 22 случаях (25,6%), 3 степени – в 4 наблюдениях (4,7%).

3.3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Большая часть больных, страдающих ХОБЛ, на момент освидетельствования не работали (n=51, 60,7%). Работали в различных отраслях народного хозяйства 30 обследованных (35,7%) и 3 чел. (3,6%) обучались в средних и высших учебных заведениях.

Таблица 25

Распределение больных ХОБЛ по степени тяжести заболевания в зависимости от длительности его течения

Длительность течения заболевания	Степень тяжести						Всего	
	Легкая		Средней тяжести		Тяжелая			
	(n=16)		(n=30)		(n=38)		(n=84)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
До 5 лет	5	31,3	5	16,7	5	13,2	15	17,9
6-10 лет	1	6,2	9	30,0	6	15,8	16	19,0
11-15 лет	4	25,0	5	16,7	5	13,2	14	16,7
16-20 лет	1	6,2	4	13,3	15	39,4	20	23,8
Более 20 лет	5	31,3	7	23,3	7	18,4	19	22,6

Распределение пациентов, страдающих ХОБЛ, по степени тяжести заболевания в зависимости от длительности его течения представлено в таблице 25. Больных с легкой степенью тяжести заболевания направлено на освидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы 16 чел., со средней степенью тяжести – 30 чел., с тяжелым течением – 38 чел.

Приведенные данные показывают, что с увеличением длительности течения заболевания отмечается увеличение числа боль-