

44,2% больных ПБ (38 чел.) и у 48,8% больных ХОБЛ (41 чел.). Проявления дыхательной недостаточности III степени при обеих нозологических формах не отмечались.

Уменьшение проявлений дыхательной недостаточности в динамике в результате проведенного лечения отмечалось у 11,8 % больных ПБ (8 чел.) и у 19,6% больных ХОБЛ (11 чел.) от числа повторно освидетельствованных. Нарастание проявлений данного осложнения в динамике наблюдалось в 29,4% случаев при ПБ (20 чел.) и в 19,6% наблюдений при ХОБЛ (11 чел.).

Ограничения жизнедеятельности имели место у 46 пациентов, страдающих профессиональным бронхитом, и в 55 наблюдениях при ХОБЛ (табл.31). При этом ограничение способности к трудовой деятельности 1 степени наблюдалось у 43,0% больных ПБ (37 чел.) и в 46,4% наблюдений при ХОБЛ (39 чел.).

Таблица 31

Наличие и степень выраженности ограничений жизнедеятельности при профессиональном бронхите и ХОБЛ (абс. ч., %, p)

Ограничения жизнедеятельности	Форма бронхита				p
	ПБ n=86		ХОБЛ n=84		
	абс.	%	абс.	%	
Ограничение способности к трудовой деятельности:					
- 1 степени	37	43,0	39	46,4	>.0.1
- 2 степени	9	10,5	1	1,2	<0.01
- 3 степени	-	-	14	16,7	<0.001
Ограничение способности к обучению:					
- 1 степени	-	-	1	1,2	>0.1
- 2 степени	-	-	-	-	-
- 3 степени	-	-	-	-	-
Ограничение способности к самостоятельному передвижению:					
- 1 степени	9	10,5	15	17,9	>0.1
- 2 степени	-	-	-	-	-
- 3 степени	-	-	-	-	-