

Таблица 32

*Оценка клинического прогноза у больных
профессиональным бронхитом и ХОБЛ (абс. ч., %, р)*

Признак	Клинический прогноз																			
	Благоприятный					Относительно благоприятный					Сомнительный					Неблагоприятный				
	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р
	абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Всего больных*	17	19,8	29	34,5	<0.05	43	50,0	24	28,6	<0.01	17	19,8	16	19,0	>0.1	9	10,0	15	17,9	>0.1
из них -мужчины	9	52,9	20	69,0	>0.1	23	53,5	19	79,2	<0.05	12	70,6	12	75,0	>0.1	7	77,8	15	100	>0.1
-- в том числе старше 40 лет	9	100	16	80,0	>0.1	22	51,2	17	41,0	>0.1	12	70,6	12	75,0	>0.1	6	66,7	15	100	>0.1
-женщины	8	47,1	9	31,0	>0.1	20	46,5	5	20,8	<0.05	5	29,4	4	25,0	>0.1	2	22,2	-	-	>0.1
-- в том числе старше 40 лет	8	100	3	33,3	<0.001	20	100	4	80,0	>0.1	5	100	4	100	>0.1	2	22,2	-	-	>0.1
Частота обострений в течение года:																				
- 1-2 и реже	17	100	26	89,7	>0.1	41	95,3	21	87,5	>0.1	13	76,5	15	93,8	>0.1	8	88,9	12	80,0	>0.1
- 3-4	-	-	3	10,3	>0.1	2	4,7	3	12,5	>0.1	3	17,6	1	6,2	>0.1	1	11,1	1	6,7	>0.1
- 5 и более	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,9	-	-	>0.1	-	-	2	13,3	>0.1
Стационарное лечение	9	52,9	22	75,9	>0.1	24	55,8	16	66,7	>0.1	8	47,1	14	87,5	<0.05	7	77,8	15	100	>0.1