

лиц старше 40 лет - 19 чел. (65,5%). Частота обострений 1-2 в год отмечалась в 89,7% наблюдений (26 чел.), 3-4 в год – в 10,3% случаев (3 чел.). Необходимость в стационарном лечении в период обострения наблюдалась у 75,9% больных ХОБЛ с благоприятным клиническим прогнозом. Отсутствие проявлений дыхательной недостаточности отмечено в 58,6% наблюдений (17 чел.). Дыхательная недостаточность I степени встречалась у 41,4% больных (12 чел.). Дыхательная недостаточность II и III степени не зафиксирована. Наличие эмфиземы легких отмечалось у 79,3% пациентов (23 чел.), диффузного пневмосклероза – в 31% наблюдений (9 чел.). Хроническое легочное сердце встречалось в 20,7% случаев (6 чел.), при этом в стадии компенсации - у 10,3% больных (3 чел.), в стадии субкомпенсации – также у 10,3% пациентов (3 чел.). Хроническое легочное сердце в стадии декомпенсации при благоприятном клиническом прогнозе не наблюдалось. Отсутствие проявлений недостаточности кровообращения отмечалось у 89,7% пациентов (26 чел.), НК I стадии – у 10,3% больных (3 чел.). НК II и III стадии не отмечено.

Среди больных ПБ с относительно благоприятным клиническим прогнозом мужчины составили 53,5% (23 чел.), женщины – 46,5% (20 чел.). Лиц старше 40 лет насчитывалось 48,8% (42 чел.). Частота обострений у подавляющего большинства пациентов (95,3%) составила 1-2 в год. Необходимость в стационарном лечении в период обострения отмечалась у 55,8% больных (24 чел.). Отсутствие проявлений дыхательной недостаточности не отмечалось, ДН I степени зафиксирована в 72,1% случаев (31 чел.), ДН IIА степени – в 27,9% наблюдений (12 чел.). ДН IIB и III степени при относительно благоприятном клиническом прогнозе не отмечено. Эмфизема легких имела место у 55,8% больных (24 чел.), диффузный пневмосклероз – у 25,6% пациентов (11 чел.). Наличия хронического легочного сердца при относительно благоприятном клиническом прогнозе не зафиксировано.

Среди больных с относительно благоприятным клиническим прогнозом при ХОБЛ мужчины составили 79,2% (19 чел.), женщины – 20,8% (5 чел.). Лиц старше 40 лет насчитывалось 87,5% (21 чел.). Частота обострений в подавляющем большинстве случаев