Таблица 33

Проявления ограничений жизнедеятельности при профессиональном бронхите и ХОБЛ
в зависимости от степени выраженности функциональных нарушений (абс., %, р)

Признак	ДН 0					ДН I					ДН II А					ДН II Б				
	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р	ПБ		ХОБЛ		р
	абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Всего больных*	13	15,1	17	20,2	>0,1	35	40,7	26	31,0	>0,1	28	32,6	23	27,4	>0,1	10	11,6	18	21,4	>0,1
Характер течения заболевания:																				
-легкое	-	-	16	94,1	<0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-средней тяжести	13	100	1	5,9	<0,001	35	100	26	100	>0,1	25	89,3	3	13,0	<0,001	4	40,0	-	-	<0,05
-тяжелое	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,7	20	87,0	<0,001	6	60,0	18	100	<0,05
Частота обострений в течение года:																				
-1-2 и реже	13	100	17	100	>0,1	33	94,3	22	84,6	>0,1	23	82,1	21	91,3	>0,1	10	100	14	77,8	<0,05
-3-4	-	-	-	-	-	2	2,3	5,7	15,4	>0,1	4	14,3	2	8,7	>0,1	-	-	2	11,1	>0,1
-5-6 и более	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,6	-	-	>0,1	-	-	2	11,1	>0,1
Эмфизема легких	3	23,1	14	82,4	<0,001	15	42,9	25	96,2	<0,001	23	82,1	21	91,3	>0,1	10	100	15	83,3	>0,1
Диффузный пневмо-склероз	4	30,8	4	23,5	>0,1	8	22,9	8	30,8	>0,1	13	46,4	12	52,2	>0,1	7	70,0	12	66,7	>0,1