

нении с соседними областями и с Российской Федерацией в целом относительно благополучная.

Уровень первичной инвалидности, обусловленной болезнями органов дыхания, в областном центре имеет тенденцию к повышению: от 1,4 на 10 тыс. взрослого населения в 1997 году до 2,0 на 10 тыс. взрослого населения в 2003 году. На протяжении 1997-2002 гг. уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания в г. Омске был значительно ниже, чем в районах Омской области. В 2003 году указанный показатель в г. Омске впервые превысил таковой по районам Омской области: 2,0 и 1,9 на 10 тыс. взрослого населения соответственно.

Общее число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов дыхания, с 1997 по 1999 г.г. неуклонно повышалось: 392 чел. – в 1997 г., 451 чел. – в 1998 г., 475 чел. – в 1999 г. С 2000 г. общая численность впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов дыхания постепенно снижается: 449 чел. – в 2000 г., 322 чел. – в 2003 г. При этом до 2000 г. абсолютное число лиц, впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов дыхания, в сельских районах Омской области увеличивалось, с 2000 г. наметилась четкая тенденция к снижению: в 1997 г. – 229 чел., в 1998 г. – 253 чел., в 1999 г. – 297 чел., в 2000 г. – 285 чел., в 2001 г. – 196 чел., в 2002 г. – 188 чел., в 2003 г. – 144 чел. (табл.36).

В областном центре абсолютное число впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов дыхания составило: в 1997 г. – 166 чел., в 1998 г. – 198 чел., в 1999 г. – 178 чел., в 2000 г. – 164 чел., в 2001 г. – 170 чел., в 2002 г. – 174 чел., в 2003 г. – 178 чел.

Таким образом, численность впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов дыхания и уровень первичной инвалидности от указанной патологии в г. Омске существенно не изменились ($r=0,32$; $p>0,1$), тогда как в районах Омской области отмечается тенденция к снижению ($r=0,8$; $p<0,05$). Вероятно, этим объясняется снижение общего уровня первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания в Омской области.

В 1997 году показатель первичной инвалидности вследствие заболеваний органов дыхания составил 2,4 на 10 тыс. взрослого населения; в 1998 году – 2,9; в 1999 году – 2,8; в 2000 году – 2,8; в 2001 году – 2,3; в 2002 году – 2,2; в 2003 году – 2,0 (рис.22). На