

Среди болезней органов дыхания профессионального генеза ведущее место занимает профессиональный бронхит. Лица, впервые признанные инвалидами вследствие данного заболевания составили более 40% от общего числа инвалидов вследствие профзаболеваний. В структуре первичной инвалидности, обусловленной профессиональным бронхитом, отмечается значительное преобладание городского населения, доля которого достигает 80%.

При первичном освидетельствовании преобладают лица среднего возраста; женщины от 45 до 55 лет, мужчины от 50 до 60 лет, что объясняется длительным стажем работы во вредных условиях труда. При этом во всех возрастных группах подавляющему большинству освидетельствованных определяется 3 группа инвалидности (табл.47).

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что больные, страдающие профессиональным бронхитом, направляются на медико-социальную экспертизу достаточно своевременно. За период с 1999 по 2003 г.г. случаев признания больных профессиональным бронхитом инвалидами 1 группы не зарегистрировано. Распределение впервые признанных инвалидами вследствие ПБ по полу и возрасту показало значительное преобладание мужчин трудоспособного возраста, которым в подавляющем большинстве случаев устанавливается 3 группа инвалидности.

Анализ состояния и структуры первичной инвалидности свидетельствует о том, что показатели первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания в Омской области значительно ниже, чем в Российской Федерации и в Сибирском федеральном округе, тогда как ситуация с первичной инвалидностью вследствие профессиональных заболеваний является неблагоприятной. Уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания снижается, однако при профессиональных заболеваниях – напротив, имеет тенденцию к повышению. При первичном освидетельствовании в обеих группах заболеваний преобладают мужчины трудоспособного возраста, которым в подавляющем большинстве случаев определяется 3 группа инвалидности. Это обуславливает медицинскую и социальную значимость болезней органов дыхания и профессиональных заболеваний в структуре первичной