

2. Изменение степени выраженности различных категорий ограничений жизнедеятельности (рис.32):

- восстановление ограничений жизнедеятельности в одной или нескольких категориях достигнуто в 6,7% случаев при ПБ (2 чел.) и у 8,0% больных (2 чел.) при ХОБЛ;
- уменьшение проявлений ограничений жизнедеятельности в одной или нескольких категориях отмечалось в 23,3% наблюдений при ПБ и в 8,0% случаев (2 чел.) при ХОБЛ;
- отсутствие положительных результатов имело место у 70,0% больных ПБ (21 чел.) и у 84,0% больных ХОБЛ (21 чел.).




Рис. 32. Оценка эффективности реабилитации при профессиональном бронхите и ХОБЛ по изменению ограничений жизнедеятельности (%)

3. Динамика проявлений социальной недостаточности в различных категориях представлена на рис.33.

Восстановление социальной недостаточности в одной или нескольких категориях наблюдалось в 3,3% наблюдений при ПБ (1 чел.) и у 8,0% больных ХОБЛ (2 чел.). Уменьшение проявлений социальной недостаточности в одной или нескольких категориях отмечалось у 23,3% больных ПБ (7 чел.) и в 44,0% случаев при ХОБЛ (11 чел.). Отсутствие положительных результатов имело место в 74,0% случаев при ПБ (22 чел.) и у 48,0% пациентов, страдающих ХОБЛ (12 чел.).