

- группа инвалидности не изменена при ПБ – в 83,3% случаев (25 чел.), при ХОБЛ у 88,0% больных (22 чел.);
- группа инвалидности повышена в 13,4% наблюдений при ПБ (4 чел.) и у 4,0% обследованных при ХОБЛ (1 чел.).

5. Результаты реализации отдельных частей индивидуальной программы реабилитации представлены в табл. 50.

Таблица 50

*Оценка эффективности реабилитации
при профессиональном бронхите и ХОБЛ по результатам
реализации отдельных частей ИПР (абс. ч., %, p)*

	ПБ (n=30)		ХОБЛ (n=25)		p
	абс.	%	абс.	%	
Медицинская:					
-восстановление нарушенных функций	1	3,3	2	8,0	>0.1
-достижение компенсации	9	30,0	11	44,0	>0.1
-отсутствие положительных результатов	20	66,7	12	48,0	>0.1
Профессиональная:					
-достижение желаемого результата	9	30,0	9	36,0	>0.1
-частичное достижение желаемого результата	-	-	10	40,0	<0.001
-отсутствие положительных результатов	21	70,0	6	24,0	<0.001
Социальная:					
-достижение желаемого результата	11	36,7	17	68,0	<0.05
-частичное достижение желаемого результата	1	3,3	5	20,0	>0.1
-отсутствие положительных результатов	18	60,0	3	12,0	<0.001

Восстановление нарушенных функций наблюдалось у 3,3% больных профессиональным бронхитом (1 чел.) и в 8,0% случаев (2 чел.) при ХОБЛ. Компенсация достигнута у 30,0% обследованных при ПБ (9 чел.) и у 44,0% больных ХОБЛ (11 чел.). Отсутствие положительных результатов имело место в 66,7% случаев при ПБ (20 чел.) и у 48,0% обследованных при ХОБЛ (12 чел.).