

дуальной программы реабилитации, степень соответствия достигнутых результатов реабилитационному потенциалу инвалида. Перечисленные критерии имеют также количественное выражение.

Сравнительная оценка эффективности результатов реабилитации показала, что в целом реабилитация более эффективна при ХОБЛ, чем при ПБ.

Большинство выявленных факторов, способствующих формированию инвалидности при профессиональном бронхите и хронической обструктивной болезни легких, являются управляемыми. Своевременное проведение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха в регионе и условий труда на рабочих местах, а также оздоровительных и реабилитационных мероприятий может значительно снизить показатели первичной инвалидности вследствие профессионального бронхита и ХОБЛ. Предлагаемые алгоритм и критерии проведения медико-социальной экспертизы и оценки эффективности реабилитации при ПБ и ХОБЛ позволяют оптимизировать медицинскую помощь больным путем объективного установления группы инвалидности на основе комплексной оценки имеющихся данных в процессе проведения реабилитационно-экспертной диагностики и оценить эффект от проведенных реабилитационных мероприятий. Для оптимизации и унификации процедуры оценки эффективности реабилитационных мероприятий лиц с ограничениями жизнедеятельности и социальной недостаточностью вследствие ПБ и ХОБЛ специалистам учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования следует использовать методику и критерии оценки эффективности реабилитации, учитывающие изменения клинического, профессионального и социального статуса больного. При разработке региональных программ комплексной реабилитации инвалидов вследствие болезней органов дыхания и профессиональных заболеваний, а также ХОБЛ различной этиологии целесообразно учитывать социально-гигиенические особенности ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности.

При проведении лечебных и реабилитационных мероприятий у больных профессиональным бронхитом и ХОБЛ рекомендуется оценивать качество их жизни в динамике лечения и реабилитации.