

12. ОСОБЕННОСТЯМИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА PORPHYROMONAS ЯВЛЯЮТСЯ:
- 1) отсутствие индолообразования
 - 2) индолообразование
 - 3) инертность к углеводам
 - 4) сильная ферментативная активность
13. К МИКРООРГАНИЗМАМ РОДА PREVOTELLA ОТНОСЯТ:
- 1) факультативные анаэробы
 - 2) облигатные анаэробы
 - 3) бактерии с отсутствием ферментативной активности
 - 4) бактерии с умеренной сахаролитической активностью
 - 5) подвижные споронеобразующие палочки
 - 6) неподвижные споронеобразующие палочки
 - 7) подвижные кокки образующие споры
14. К ОСОБЕННОСТЯМ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА PREVOTELLA ОТНОСЯТ:
- 1) неприхотливость к составу питательных сред
 - 2) образование пигментированных колоний через 48 часов
 - 3) образование непигментированных колоний
 - 4) образование пигментированных колоний через 5-14 суток
15. КЛЮЧЕВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПРЕВОТЕЛЛ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) ингибирование роста под действием желчных солей
 - 2) чувствительность к ванкомицину
 - 3) чувствительность к канамицину
 - 4) устойчивость к колистину
 - 5) чувствительны к колистину
 - 6) резистентны к ванкомицину и канамицину
16. ФАКТОРАМИ ПАТОГЕННОСТИ ПРЕВОТЕЛЛ ЯВЛЯЮТСЯ:
- 1) экзотоксин
 - 2) фосфолипаза А
 - 3) эндотоксин
 - 4) капсула