

бет) и иммунные нарушения. Развитию кандидоза способствуют повреждения кожных покровов, повышенное потоотделение, мацерации, обменные и гормональные нарушения (например, сахарный диабет), беременность, а также прием пероральных контрацептивов. Чрезмерный рост кандид провоцируют также дисбактериозы, вызванные неадекватным применением антибиотиков широкого спектра действия. Иммунодефицитные состояния, приём иммунодепрессантов способны вызывать молниеносные формы, хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек. Клинически выделяют кандидоз кожных покровов, кандидоз ногтевых валиков и ногтей, кандидоз слизистых оболочек, хронический кожно-слизистый кандидоз, диссеминированный (висцеральный) кандидоз.

Кандидоз кожных покровов развивается на прилегающих друг к другу поверхностях тела и в кожных складках, характеризующихся достаточно высокой температурой и повышенной влажностью. Кандидоз интертриго проявляется опрелостями с последующим присоединением эритематозных или везикулёзно-пустулёзных высыпаний, трансформирующихся в эрозии с беловатыми некротизированными участками эпителия.

Кандидоз слизистых оболочек (молочница). Заболевание развивается на фоне метаболических расстройств, а также при нарушении нормального микробного ценоза слизистых оболочек.

Кандидоз слизистой оболочки полости рта часто развивается вследствие приёма антибиотиков широкого спектра или иммунодефицитных состояний.

Местное поражение полости рта грибами кандиды (*C.albicans* или *C.tropicalis*) называется "молочницей". Более обширное поражение – кандидомикозом. Встречаются поражения языка, слизистой щек, губ, углов рта. Кандидозный стоматит протекает схоже с язвенным стоматитом. При резком ослаблении иммунных сил организма возможно развитие кандидосепсиса, характеризующегося общей обсемененностью организма и возможным смертельным исходом. Кандидомикоз полости рта характеризуется появлением на гиперемизированной, сухой и болезненной слизистой оболочке молочно-белого, рыхлого, легко снимаемого налета – белых или желтоватых «творожистых» бляшек на поверхности слизистой оболочки (отсюда молочница), после удаления