

ГЕРПАНГИНА

вызывается вирусом Коксаки группы А (серовары 2-6, 8, 10). Источником инфекции служат больные. Передача осуществляется преимущественно воздушно-капельным и алиментарным путем. Чаще болеют дети. Герпангина характеризуется папулезно-везикулезными высыпаниями на мягком небе, дужках, язычке, миндалинах.

Диагноз ставится на основе использования вирусологического метода, при котором материалом от больного (смазками и мазками из носоглотки) заражают культуры клеток и мышат-сосунков.

ЯЩУР

вызывается вирусом, который относится к пикорнавирусам рода *Aphthovirus*. Ящур – высоко контагиозное заболевание животных, чаще крупного рогатого скота. Человек может заразиться при контакте с больными животными и алиментарным путем через молоко и мясо. Входными воротами является слизистая оболочка полости рта. Как и у животных, у человека развивается афтозный стоматит, причем поражаются десны, щеки, язык, губы. Высыпания могут быть и на коже крыльев носа, межпальцевых складках, основаниях ногтей, подошве. Для постановки лабораторного диагноза содержимое пустул вводят в скарифицированную кожу подошвы морской свинки, где появляются типичные афты, что позволяет дифференцировать ящур от герпетического гингивостоматита и язвенно-некротического стоматита.

ТУБЕРКУЛЕЗ

Возбудителем туберкулеза является *Mycobacterium tuberculosis*. Некоторые инфекционисты считают, что, по крайней мере, один недиагностированный больной туберкулезом может оказаться на приеме у врача-стоматолога в течение года. Особое внимание в этом плане следует обращать на больных сахарным диабетом, иммунодефицитным состоянием, силикозом легких, и также алкоголиков. Больной туберкулезом легких представляет опасность для врача-стоматолога в стадии выделения палочек, когда возможно заражение воздушно-капельным путем.

Туберкулезные поражения полости рта представляют собой проявления общего заболевания. Наиболее часто палочки попа-