

19. ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕСТАМИ АКТИНОМИКОЗА ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) обнаружение друз
 - 2) наличие почкующихся дрожжевых клеток
20. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПРИ АКТИНОМИКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) торакальный актиномикоз
 - 2) абдоминальный актиномикоз
 - 3) актиномикоз лица
 - 4) актиномикоз мочеполовой системы
 - 5) генерализованный актиномикоз
 - 6) актиномикоз ЦНС
 - 7) актиномикоз костей
21. ХАРАКТЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ТРЕПОНЕМ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) гр (-) микроорганизмы
 - 2) гр(+) микроорганизмы
 - 3) хорошая восприимчивость к анилиновым красителям
 - 4) плохая восприимчивость к анилиновым красителям
 - 5) способность образовывать споры
 - 6) способность образовывать L-формы
22. БИОХИМИЧЕСКИМИ И КУЛЬТУРАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ *T. PALLIDUM* ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) хороший рост на простых питательных средах
 - 2) неприхотливость к условиям культивирования
 - 3) требовательность к условиям культивирования
 - 4) образование индола
 - 5) образование сероводорода
 - 6) разжижение желатины
 - 7) ферментация глюкозы, сахарозы, галактозы, мальтозы, маннита
 - 8) биохимическая инертность