

23. К МЕТОДАМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА ОТНОСЯТ
- 1) темнопольную микроскопию
 - 2) фазово-контрастную микроскопию
 - 3) бактериологический метод
 - 4) серологический метод
24. ОСОБЕННОСТЯМИ СТРУКТУРЫ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АДЕНОВИРУСОВ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) геном вирусов состоящий из однонитиевой линейной ДНК
 - 2) геном вирусов состоящий из двунитиевой линейной ДНК
 - 3) геном представленный РНК
 - 4) наличие внешней оболочки
 - 5) отсутствие внешней оболочки
 - 6) нуклеокапсид вириона в виде сферической частицы d 70-90 нм
 - 7) нуклеокапсид представленный сферической формой d 140-210 нм
25. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АДЕНОВИРУСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
- 1) в курином эмбрионе
 - 2) в организме чувствительных лабораторных животных
 - 3) в первичной культуре клеток почки эмбриона человека
 - 4) на линии клеток Hela
 - 5) на линии клеток Нер-2
26. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- 1) выявляют в крови типоспецифические антитела
 - 2) используют ретроспективное подтверждение диагноза
 - 3) используют экспресс-метод диагностики
 - 4) используют реакции РСК, РТГА, РН, ИФА
 - 5) осуществляют метод парных сывороток