

27. ВИРУС КОРИ ИМЕЕТ
- 1) сферическую форму d 150-250 нм
  - 2) сферическую форму d 70-90 нм
  - 3) геном образованный несегментированной одностранным молекулой РНК
  - 4) геном образованный двустранным молекулой ДНК
  - 5) не имеет внешней оболочки
  - 6) внешнюю оболочку, образованную двойным слоем липидов
28. ОСНОВНЫМИ АНТИГЕНАМИ ВИРУСА КОРИ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) гемагглютинины
  - 2) белок М
  - 3) белок F
  - 4) нуклеокапсидный белок NP
29. ЦПД ВИРУСА КОРИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В
- 1) образовании синцитиев
  - 2) появлении включений в цитоплазме клеток
30. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ВИРУСА КОРИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
- 1) на курином эмбрионе
  - 2) в организме чувствительного лабораторного животного
  - 3) в первичных культурах эмбриональных клеток почки человека
  - 4) на перевиваемых линиях клеток Hela, Vero
31. ОСОБЕННОСТЯМИ ПАТОГЕНЕЗА КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) первичная репродукция вируса происходит в эпителиальных клетках носоглотки и верхних отделах дыхательных путей
  - 2) вирусная репродукция в клетках ЦНС
  - 3) вирусемия кратковременного характера
  - 4) поражение эндотелия кровеносных капилляров
  - 5) возможное персистирование вируса в лимфоидных тканях и нейронах ЦНС
  - 6) возникновение гастроэнтеритов при репродукции вируса в эпителиальных клетках ЖКТ