

15. МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЛОСТИ РТА ОБЛАДАЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА
- 1) различной аффинностью
 - 2) одинаковой аффинностью
16. МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЛОСТИ РТА ОБЛАДАЮТ РАЗНОЙ АФФИННОСТЬЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К
- 1) эмали ямок поверхности зуба
 - 2) эмали фиссур зуба
 - 3) к гладкой поверхности зуба
17. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ЧЕРТАМИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КАРИЕСОГЕННОГО СТРЕПТОКОККА S. MUTANS ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) ферментация гликогена
 - 2) ферментация крахмала
 - 3) ферментация декстрина
 - 4) ферментация инулина
 - 5) ферментация рафинозы
 - 6) образование H_2O_2
 - 7) гидролиз аргинина
 - 8) устойчивость к бацитрацину
18. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ЧЕРТАМИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КАРИЕСОГЕННОГО СТРЕПТОКОККА S. FERUS ЯВЛЯЮТСЯ
- 1) ферментация гликогена
 - 2) ферментация крахмала
 - 3) ферментация декстрина
 - 4) ферментация инулина
 - 5) ферментация рафинозы
 - 6) образование H_2O_2
 - 7) гидролиз аргинина;
 - 8) устойчивость к бацитрацину