

11. ХРОНИЧЕСКИЕ ОЧАГИ ИНФЕКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА

Хронические локализованные процессы в полости рта в некоторых случаях могут явиться причиной системных заболеваний и получили название хронических очагов инфекции. Влияние одонтогенных очагов на организм в некоторых случаях является спорным, однако несомненен тот факт, что у каждого индивидуума иммунный ответ генетически обусловлен. Установлено, что у людей с HLA B5 присутствует характерная иммунная реакция на стрептококковые антигены.

Хроническими одонтогенными очагами инфекции в полости рта являются хронические гангренозные пульпиты, хронические периодонтиты (гранулирующий и грануломатозный). Пародонтит, хронический перикоронорит, хронический остеомиелит.

Условно можно представить развитие одонтогенного воспаления следующим образом:

1. Распространение микробов из очага инфекции и их воздействие на ткани и органы.
2. Распространение токсинов из очага и их воздействие на органы.
3. Антигенное воздействие микробов на организм.

Распространение микробов из очага инфекции

Чистка зубов, кюретаж, удаление зубов, трансплантация могут привести к непродолжительной бактериемии. Кроме того, микробы из полости рта могут попасть в кровь при тяжелых некротических гингивитах и стоматитах, из патологических десневых карманов, особенно при абсцедировании, из корневых каналов при некротическом пульпите, из кист и грануляций при хроническом периодонтите. При нормальном состоянии организма эта непродолжительная бактериемия максимально может выражаться только в повышении температуры.

При снижении активности факторов резистентности после выхода микробов из очага может наблюдаться их размножение и колонизация других тканей. В этом плане особенно опасны бактерии из полости рта, так как многие из них обладают способностью прикрепляться к поверхности клеток или других структур. Декстран образующие стрептококки *S.mutans*, *S.sanguis* часто яв-