

инфекций, новых, разрешенных к применению и сертифицированных средствах и методах дезинфекции и стерилизации местными органами здравоохранения издаются Приказы и инструкции, регламентирующие санитарно-гигиенический режим в лечебных учреждениях региона.

12.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ

Текущая дезинфекция стоматологических кабинетов должна проводиться не реже двух раз в сутки при односменном режиме работы и не реже трех раз – при двухсменном.

При текущей дезинфекции, кроме уборки кабинета и мытья пола (с добавлением дезинфицирующего и моющего средств), обеззараживают мебель, оборудование, краны и раковины, дверные ручки, пол. Обработку проводят двукратным протиранием ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором, например, 1% раствором хлорамина, средствами «Дезэфект», «Бромосепт-50», «Демос», «Жавелион», «Жавелион-солид.» в соответствующей концентрации. После уборки и дезинфекции включают бактерицидные лампы на 30 мин.

Бактерицидные ультрафиолетовые облучатели (длина волны излучения 205-315 нм) должны устанавливаться в каждом помещении, где необходимо соблюдение дезинфекционного режима: в лечебных кабинетах, помещении стерилизационной и т.д. Бактерицидные облучатели подразделяются на *открытые* и *закрытые*

Текущая уборка и дезинфекция также должны производиться в процессе работы. Поверхности, с которыми контактировал пациент и медперсонал (**подголовник, стоматологическое кресло, столик врача** и т.д.), следует после каждого пациента обеззараживать двукратным протиранием их ветошью, смоченной растворами дезинфицирующих препаратов, например, перекись водорода, «Дезоксон-1», «Дезидент», «ПВК», «ПФК-1», «Аламинол», «Септустин», «Лептабик».