

тить, что наибольшее число бактериальных клеток выявляется микроскопическим способом, однако общепринято считать, что на 1 живую клетку в материале приходится 4 погибших или нежизнеспособных.

Таблица 2

Основные группы резидентной флоры полости рта
по морфологии и типу дыхания

Окраска по Граму	Морфология	Название рода
1 ГРУППА: С АНАЭРОБНЫМ ТИПОМ ДЫХАНИЯ (ОБЛИГАТНЫЕ АНАЭРОБЫ)		
Грамотрицательные	кокки	VEILLONELLA
	палочки	BACTEROIDES PORPHYROMONAS PREVOTELLA FUSOBACTERIUM LEPTOTRICHIA
Грамположительные	кокки	PEPTOSTREPTOCOCCUS PEPTOCOCCUS
	палочки беспоровые	LACTOBACTERIUM BIFIDOBACTERIUM EUBACTERIUM PROPIONIBACTERIUM ACTINOMYCES
	палочки спорообразующие	CLOSTRIDIUM
2 ГРУППА: С АЭРОБНЫМ И СМЕШАННЫМ ТИПОМ ДЫХАНИЯ (АЭРОБЫ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ АНАЭРОБЫ)		
Грам-негативные	кокки	NEISSERIA
	палочки	PSEUDOMONAS BORDETELLA EIKENELLA
Грам-позитивные	кокки	STREPTOCOCCUS STAPHYLOCOCCUS
	палочки беспоровые	CORINEBACTERIUM NOCARDIA, ROTHIA
	палочки спорообразующие	BACILLUS