

Изменение состава микрофлоры

Изменение микробиоценоза	Характеристика состояния микробных популяций
Дисбиотический сдвиг	Характерны незначительные изменения - превышение количества одного вида условнопатогенного микроорганизма при сохранении нормального видового состава микрофлоры полости рта. Эту форму сдвига можно назвать латентной или компенсированной, при этом могут отсутствовать выраженные клинические признаки заболевания.
Дисбактериоз I-II степени	Субкомпенсированная форма - характеризуется более выраженными изменениями состава микрофлоры: выявление 2-3 патогенных видов на фоне некоторого снижения титра лактобактерий. клинические симптомы болезни
Дисбактериоз III степени	Характеризуется выявлением патогенной монокультуры при резком снижении количества или полном отсутствии представителей нормальной (физиологической) микрофлоры.
Дисбактериоз IV степени	Характеризуется наличием ассоциаций патогенных видов бактерий с дрожжеподобными грибами.

Дисбактериоз слизистой оболочки рта наиболее часто возникает и развивается у больных с так называемым «вторичным» иммунодефицитом, причины которого разнообразны. Существенным фактором является нарушение процессов пищеварения, всасывания и усвоения пищевых веществ, приводящее к резкому снижению сопротивляемости организма. Чаще всего развитие дисбактериоза полости рта наблюдается у лиц с заболеваниями пищеварительной системы, а именно дисбактериоз кишечника, хронический колит, хронический гастрит и др.

При дисбактериозе полости рта жалобы больных характеризуются значительным разнообразием - сухость губ, трещины на красной кайме губ и в углах рта, жжение языка, налет на языке, жжение и сухость слизистой оболочки полости рта.