

6. АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПОЛОСТИ РТА. ИХ РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ, ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

Бактериологическое исследование анаэробной микрофлоры (Коршунов В.М. с соавт., 1999)

Бактериологическое исследование вагинальной микрофлоры включает следующие этапы:

I. Забор, транспортировку и подготовку к посеву исследуемого материала.

II. Посев исследуемого материала на селективные питательные среды с последующим определением количественного и качественного состава микрофлоры;

III. Регистрация полученных результатов с заключением и рекомендациями врача-бактериолога.

Важным фактором, значительно влияющим на успех микробиологической диагностики, является корректный способ забора и транспортировки исследуемого материала, получаемого от больных. Основные правила, которые должны всегда соблюдаться при заборе материала, следующие:

- 1) Материал для исследования должен быть взят в день обращения больного в лечебное учреждение;
- 2) забор материала должен всегда осуществляться до начала антибактериальной терапии или до начала лечения биотерапевтическими препаратами, а также до начала проведения других местных терапевтических вмешательств;
- 3) бактериологическая обработка исследуемого материала должна быть осуществлена по возможности быстро - для предотвращения гибели бактерий, чувствительных к различным факторам окружающей среды, и во избежание размножения в исследуемом материале бактерий-комменсалов.

Рекомендуется использовать пробирки с 5 мл восстановленной (прокипяченной) тиогликолевой среды, заполненные газом (пропан) и закрытые хорошо притертыми резиновыми пробками. Пробирка со средой должна быть взвешена до внесения в нее исследуемого материала. От