

ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ

вызывается вирусом *Herpes simplex I* типа. Вирусы герпеса, Коксаки, ящура, везикулярного стоматита вызывают клинически схожую картину. На слизистой сначала появляется пузырек, а затем афта. Вирус герпеса является одной из самых частых причин вирусных заболеваний детей. Первичное инфицирование происходит при контакте со взрослыми вирусоносителями. Заболевание протекает как в форме острой инфекции, так и при активации латентного носительства.

Острый герпетический гингивостоматит протекает с повышением температуры, сильными болями в полости рта. Сначала появляется гиперемия, затем формируются везикулы, которые быстро переходят в афту. Клинически это выглядит как эрозия, овальной или щелевидной формы с ровными краями, гладким дном, покрытым серовато-белым налетом. Локализуются афты чаще на слизистой оболочке неба, языка, губ, переходных складок. Некротизированные участки десны имеют желтовато-белый цвет, не снимающийся при протирании. Осложнение процесса подключением пиогенных кокков утяжеляет течение заболевания. Вирусологический диагноз основывается на подготовке мазков-отпечатков, окрашенных по Романовскому-Гимза и обнаружении характерных многоядерных гигантских клеток. С помощью иммунофлюоресценции можно обнаружить в пораженных клетках вирусный антиген. Также можно провести выделение вируса, заражая куриный эмбрион или культуру клеток почек кролика. Серологическим методом (ИФА) выявляют повышение титра антител к вирусу простого герпеса типа 1.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ вызывается вирусом, из группы альфа-герпес-вирусов (*Varicella-zoster*). Вирус вызывает два типа поражений - ветряную оспу (*varicella*) и опоясывающий лишай (*zoster*). Ветряная оспа характеризуется папуловезикулезными высыпаниями на коже и слизистых оболочках и поражает, в основном, детей, возникает при первичном контакте с вирусом *Varicella-zoster*. Опоясывающий лишай чаще возможен на фоне других заболеваний как результат ослабления защитных сил макроорганизма. Вирус поражает задние корешки спинного мозга и