

Возбудителями являются *F.nucleatum*, *T.vinsentii*, *P.melaninogenica*, *P.gingivalis* и *P.intermedia*. У пациентов со СПИДом частым возбудителем гингивита является *C.rectus*.

АКТИНОМИКОЗ **Основные возбудители**

Основным возбудителем актиномикоза является *A.israelii*, также возможна ассоциация с грамотрицательными бактериями *A.actinomycetemcomitans* и *H.aphrophilus*.

11. ХРОНИЧЕСКИЕ ОЧАГИ ИНФЕКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА

Хронические локализованные процессы в полости рта в некоторых случаях могут явиться причиной системных заболеваний и получили название хронических очагов инфекции. Влияние одонтогенных очагов на организм в некоторых случаях является спорным, однако несомненен тот факт, что у каждого индивидуума иммунный ответ генетически обусловлен. Установлено, что у людей с HLA B5 присутствует характерная иммунная реакция на стрептококковые антигены.

Хроническими одонтогенными очагами инфекции в полости рта являются хронические гангренозные пульпиты, хронические периодонтиты (гранулирующий и грануломатозный), пародонтит, хронический перикоронорит, хронический остеомиелит.

Условно можно представить развитие одонтогенного воспаления следующим образом:

1. Распространение микробов из очага инфекции и их воздействие на ткани и органы.
2. Распространение токсинов из очага и их воздействие на органы.
3. Антигенное воздействие микробов на организм.