

- Нельзя покидать своего рабочего места в перчатках.
- В случае разрыва перчатки ее следует немедленно снять, тщательно вымыть руки и надеть новую перчатку.

В каждом стоматологическом кабинете должна иметься в наличии **«Аптечка экстренных ситуаций»** («Анти-СПИД»), которая предназначена для применения в случае угрозы инфицирования врача или среднего медперсонала в результате попадания на кожу, спецодежду или в глаза слюны или крови пациента, а также в случае повреждения кожи.

«Аптечка экстренных ситуаций» должна быть укомплектована следующими средствами и предметами медицинского назначения:

- 70% этиловый спирт;
- 5% настойка йода;
- навеска калия перманганата и соответствующее количество дистиллированной воды для приготовления раствора в разведении 1:10 000;
- 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид);
- 1 % раствор протаргола;
- стерильный перевязочный материал;
- напальчники;
- лейкопластырь;
- ножницы.

При загрязнении кожи рук слюной или кровью их тщательно моют проточной водой с мылом, затем дезинфицируют 70% *этиловым спиртом* либо любым имеющимся в наличии «кожным» антисептиком.

При повреждении кожи (случайный укол иглой, порез), не останавливая кровотечения, из поврежденной поверхности выдавливают кровь. Кожу обрабатывают 70% *этиловым спиртом* или «кожным» антисептиком, затем — *йодом* и накладывают повязку.

При попадании заразного материала **в ротовую полость** ее немедленно прополаскивают 70% *этиловым спиртом*.

При попадании крови на лицо его тщательно моют с мылом, глаза промывают водой или раствором *перманганата калия* в разведении 1:10 000.