

12. Особенности ферментативной активности микроорганизмов рода *Porphyromonas* являются:

1. отсутствие индолообразования;
2. индолообразование;
3. инертность к углеводам;
4. сильная ферментативная активность

13. Отметить особенности микроорганизмов рода *Prevotella*:

1. факультативные анаэробы;
2. облигатные анаэробы;
3. отсутствие ферментативной активности;
4. умеренная сахаролитическая активность;
5. подвижные споронеобразующие палочки;
6. неподвижные споронеобразующие палочки;
7. подвижные кокки, образуют споры

14. Перечислить особенности культивирования микроорганизмов рода *Prevotella*:

1. неприхотливы к составу питательных сред;
2. образуют пигментированные колонии через 48 часов;
3. образуют непигментированные колонии;
4. образуют пигментированные колонии через 5-14 суток

15. Отметить ключевые признаки превотелл

1. ингибирование роста под действием желчных солей;
2. чувствительность к ванкомицину;
3. чувствительность к канамицину;
4. устойчивость к колистину;
5. чувствительны к колистину;
6. резистентны к ванкомицину и канамицину

16. Перечислить факторы патогенности превотелл:

1. экзотоксин;
2. фосфолипаза А;
3. эндотоксин;
4. капсула