

26. *При проведении серологической диагностики аденовирусной инфекции*
- 1) выявляют в крови типоспецифические антитела
 - 2) используют ретроспективное подтверждение диагноза
 - 3) используют экспресс-метод диагностики
 - 4) используют реакции РСК, РТГА, РН, ИФА
 - 5) осуществляют метод парных сывороток
27. *Вирус кори имеет*
- 1) сферическую форму d 150-250 нм
 - 2) сферическую форму d 70-90 нм
 - 3) геном образован несегментированной однонитчатой молекулой РНК
 - 4) геном образован двунитчатой молекулой ДНК
 - 5) не имеет внешней оболочки
 - 6) внешняя оболочка вируса образована двойным слоем липидов
28. *Указать основные антигены вируса кори*
- 1) гемагглютинины
 - 2) белок М
 - 3) белок F
 - 4) нуклеокапсидный белок NP
29. *ЦПД вируса кори проявляется в*
- 1) образовании сипластов
 - 2) появлении включений в цитоплазме клеток
30. *Культивирование вируса кори осуществляют*
- 1) на курином эмбрионе
 - 2) в организме чувствительного лабораторного животного
 - 3) в первичных культурах эмбриональных клеток почки человека
 - 4) на перевиваемых линиях клеток Hela, Vero