

дил: S. Lidocaini 1 %-20 ml + S. Metrogil 4,0 ml. Вторым этапом проводилась терапия против внутриклеточной инфекции также 6 блокад, в состав смеси входил: S. Lidocaini 1 %-20 ml + S. Ciprofloxacini 2,0 ml. Блокады проводились под ТРУЗИ контролем.

После первых лечебных блокад пациенты отметили исчезновение тазовых болей и астено-депрессивного состояния. Два пациента испытывали в течении 3-х дней дискомфорт в промежности - в месте введения иглы. Осложнений не было.

Проведено обследование после лечения. Секрет простаты: лейкоциты 4 в п/з (± 2), эритроциты 1 в п/з (± 1), лецитиновые зёрна умеренное количество, флоры не обнаружено. Уретральный мазок: лейкоциты 2 в п/з (± 1), эпителий 2 в п/з (± 1), слизь - незначительно, флора - единичные кокковые бактерии. ПЦР и посевы из уретры и посевы из спермы на ИППП - отрицательно. Посевы из спермы на сапрофитную флору - отрицательно. За день до сдачи анализов проводилась провокация S. Rigonal 25 mkg в/м.

УЗИ: средний объём простаты 22 см³ ($\pm 1,5$) признаки калькулёза простаты, ДГПЖ, остаточной мочи нет. Урофлоуметрия: Q_{max} = 17 мл/сек (± 3), V₁=285 мл (± 25), T= 30сек (± 4). PSA = 1,12 мкг/мл ($\pm 0,31$). IPSS = 5 (± 3), QOL = 2 (± 1). Шкала Оценки Симптомов Хронического Простатита = 7 (± 2)баллов.

Пациенты наблюдаются в течении 6 мес. Жалобы возобновились только у 1 пациента с выявленной Trichomonas vaginalis et Ureaplasma hominis et Chlamidia trahomatis (при исследовании гистологии), но в меньшей степени. Проведён повторный курс без лечебных парапростатических блокад. Выписан с выздоровлением. От проведения повторной, контрольной трансректальной биопсией простаты все пролеченные пациенты отказались, ссылаясь на отсутствие жалоб.

Динамическая таблица пациентов обследованных до и после лечения.

Методы исследования		До лечения	После лечения
Уретральный мазок	Лейкоциты	2 в п/з (± 1)	2 в п/з (± 1)
	Эпителий	2 в п/з (± 1)	2 в п/з (± 1)
	Слизь	незначительно	незначительно
	Флора	Единичные кокковые бактерии	единичные кокковые бактерии
Секрет простаты	Лейкоциты	4 в п/з (± 2)	4 в п/з (± 2)
	Эритроциты	1 в п/з (± 1)	1 в п/з (± 1)
	Лецитиновые зёрна	умеренное количество	умеренное количество
	Флора	не обнаружено	не обнаружено
ПЦР из уретры		отрицательно	отрицательно
Бактериальные посевы из уретры на ИППП		отрицательно	отрицательно
Бактериальные посевы из спермы на ИППП		отрицательно	отрицательно
Бактериальные посевы из спермы на сапрофитную флору		отрицательно	отрицательно
УЗИ простаты и мочевого пузыря	V _{простаты}	26 см ³ (± 4)	22 см ³ ($\pm 1,5$)
	V ₂	0	0
Урофлоуметрия	Q _{max}	15 мл/сек (± 3)	17 мл/сек (± 3)
	V ₁	163 мл (± 18)	285 мл (± 25)
	T	32 сек (± 4)	30сек (± 4)