

индивидуальной непереносимостью лекарства необходима срочная отмена лекарства. При выраженной анемии с заместительной целью применяют трансфузии эритроцитной массы. При выраженном геморрагическом синдроме показано использование концентрата тромбоцитов. Иногда проводится лечение глюкокортикоидами, либо иммунодепрессантами (циклофосфан, метотрексат). До настоящего времени окончательно не решен вопрос о показаниях к спленэктомии.

Одним из основных методов лечения больных тяжелой апластической анемией остается трансплантация костного мозга от доноров, подобранных по системе HLA. Наиболее благоприятны трансплантации от однойяйцевых близнецов. В этих случаях иногда удается трансплантация без предварительной иммунодепрессии, обязательной перед трансплантацией костного мозга. Костный мозг обычно берут у братьев или сестер больного. Для профилактики отторжения используют циклофосфан. Одним из тяжелых осложнений трансплантации является вторичная болезнь “трансплантат против хозяина” в виде поражения кожи, печени, желудочно-кишечного тракта. Для профилактики отторжения и вторичной болезни используют иммунодепрессант циклоспорин А.

При помощи трансплантации костного мозга удастся помочь более чем половине больных тяжелой апластической анемией. Спленэктомия с последующим лечением анаболическими гормонами, антилимфоцитарным глобулином приводит к ремиссии почти у половины больных тяжелой анемией. Прогноз лучше при увеличении содержания ретикулоцитов, нормальном соотношении между фракциями в костном мозге, хотя бы небольшом количестве мегакариоцитов, и некотором эффекте от преднизолона. В этих случаях помогает уже одна спленэктомия.

14. Эритроцитозы

Эритроцитоз – гематологический симптом, сопровождающийся увеличением количества эритроцитов свыше $5 \times 10^{12}/л$. Исходя из этого определения понятия, деление эритроцитозов на первичные и вторичные требует особого понимания.

К первичным эритроцитозам относится только эритремия. Некоторые гематологи считают эту классификацию устаревшей, предполагая, что все эритроцитозы вторичны, а эритремия - это заболевание системы крови опухолевого характера, в развитии которого один из первичных симптомов - это увеличение общего количества эритроцитов в крови. Последнее обусловлено необратимой гиперплазией костного мозга в связи со