

1	2	3	4
25	Уздечка верхней губы	8,61	0,157
26	Гиперлордоз поясничного отдела	4,13	0,147
27	Гипотония мышц	1,90	0,144
28	Деформированная ушная раковина	5,33	0,141
29	Гипертелоризм глаз	6,58	0,128
30	Тонкая просвечивающая кожа	1,97	0,126
31	Гипотелоризм глаз	4,98	0,120
32	Второй валец стопы больше первого	1,52	0,116
33	Экзофтальм	4,73	0,104
34	Эпикант	4,59	0,096
35	Гетерохромия радужки	3,16	0,093
36	Дополнительные зубы	2,71	0,091
37	Сандалевидная щель	1,34	0,090
38	Передняя диастема	3,80	0,089
39	Энофтальм	4,36	0,083
40	«Полая стопа»	2,55	0,068
41	Низкий рост волос на лбу, на шее	1,92	0,065
42	Большие торчащие уши	8,22	0,060
43	«Мятые» ушные раковины	3,57	0,050

Генеалогический анамнез, дерматоглифическое исследование при дисплазии соединительной ткани

Проведение генеалогического исследования с целью установления возможностей прогнозирования признаков ДСТ у потомства обязательно [3]. Для удобства концентрации информации и наглядности составляют схемы семейных родословных, в которых пользуются условными обозначениями (рис. 1). Обследуемый больной называется пробандом. Все родные братья и сестры (сибсы) в схеме располагаются в порядке появления на свет, слева направо, внутри поколения каждый его член обозначается арабской цифрой. Римской цифрой, проставленной слева, обозначаются последовательные поколения. Значки, обозначающие родственников, страдающих заболеванием, что и пробанд, заштриховываются (рис. 2).

С целью изучения роли наследственности используется метод дерматоглифики как дополнительный генетический маркер. Интерес к дерматоглифике не случаен, так как комплекс узоров сгибательной поверхности пальцев и ладоней генетически детерминирован [3].